



БЕШЕНСТВО

**28 сентября – Всемирный
день борьбы против
бешенства**

Подъяловская К.Д. – врач отделения особо опасных инфекций с санитарно-карантинным пунктом ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»

Бешенство

Бешенство – вакциноконтролируемое зоонозное вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему.

Инкубационный период, как правило, составляет 1-3 месяца. Короткий инкубационный период (от 7 дней до месяца) наблюдается при повреждениях лица, головы, шеи и пальцев рук.

Выделяют три стадии бешенства:

Продромальная стадия

(характеризуется общим недомоганием, головной болью, нарушением сна, наличием беспокойства; в области зажившей раны появляется отечность и покраснение, зуд, тянущие боли по ходу нервных окончаний, ближайших к месту укуса)

Стадия возбуждения

(характеризуется повышенной возбудимостью, изменениями психики, зрительными и звуковыми галлюцинациями, слюнотечением и различными фобиями: гидрофобия, аэрофобия, акустикофобия)

Паралитическая стадия

(характеризуется выраженным снижением двигательной и чувствительной функций, появлением параличей; смерть наступает от остановки дыхания и паралича сердечной мышцы)

На этапе появления клинических симптомов летальность составляет 100%.

Бешенство

Вирус бешенства выделяется со слюной больного животного: три варианта контактного механизма передачи:

- Укусы
- Ослюнение кожных покровов
- Оцарапывание



ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО БЕШЕНСТВУ В МИРЕ


В 2026 году наиболее неблагоприятная эпидемиологическая ситуация сохранялась в странах Азии и Африки, где продолжается активная циркуляция вируса среди домашних собак.

По данным ВОЗ, только в Индии ежегодно регистрируется около 18–20 тыс. случаев смерти от бешенства, что составляет почти треть всех смертей от данного заболевания в мире.

На Филиппинах в первой половине 2026 года зарегистрировано более 120 случаев заболевания людей.

В странах Африки наиболее неблагоприятная ситуация сохраняется в Танзании, Эфиопии, Кении, Уганде, Нигерии, Демократической Республике Конго и Южно-Африканской Республике.

По оценкам ВОЗ, ежегодно в странах Африки регистрируется около 21000 случаев смерти людей от бешенства.



Летучие мыши

- В Беларуси обитает 19 видов рукокрылых, из них: 8 видов включено в Красную книгу Республики Беларусь.
- Все летучие мыши белорусской фауны питаются исключительно насекомыми.
- В конце июля либо во второй половине сентября-октября в период осенних миграций, летучие мыши могут залететь в дом, квартиру, чердак или другое помещение.
- Летучие мыши являются переносчиками вируса бешенства. Серопозитивные особи живут в течение многих лет и сохраняют вирус бешенства без развития клинических проявлений!



Меры профилактики

необходимо соблюдать установленные правила содержания домашних животных (собак, кошек и др.) и проводить обязательную ежегодную профилактическую вакцинацию своих питомцев против бешенства;

приобретать животных только при наличии ветеринарного освидетельствования; при взятии в семью ранее безнадзорного животного (подобрали на даче, в лесу или на улице) необходимо найти возможность в короткий срок показать его ветеринарному специалисту для проведения обязательной профилактической вакцинации против бешенства и ветеринарного наблюдения;

в случаях изменений в поведении домашнего животного, получения им травм от другого животного, смерти без видимых на то причин, необходимо обязательно обратиться к ветеринарному специалисту для установления наблюдения или выяснения причины смерти животного;

разъяснять детям правила общения с животными и необходимости информирования взрослых в случае даже незначительных повреждений, нанесенных животными;

при появлении диких животных на личных подворьях в сельской местности, на территории населенных пунктов принять меры предосторожности, не допустить контакта с животными, поскольку здоровые дикие животные, как правило, избегают встречи с человеком;

использовать механические средства защиты окон (москитные сетки) для предотвращения залета рукокрылых в помещения;

незамедлительно обратиться в организацию здравоохранения по месту жительства в случае контакта (получение укусов, царапин, ссадин или ослюнения кожных покровов, слизистых) с животным больным бешенством или подозрительным на заболевание бешенством.

Что делать и как вести себя, если летучая мышь залетела в дом (квартиру)?

летучие мыши не проявляют агрессию по отношению к человеку или домашнему животному;

не допускать контактов летучей мыши с домашними животными;

не пытаться самостоятельно ловить летучую мышь, поскольку вы можете травмировать животное и травмироваться сами;

если все-таки есть необходимость отлова летучей мыши: использовать плотные перчатки (или ткань); если перчатки отсутствуют – накрыть животное какой-либо коробкой, подсунуть под коробку плотный лист картона, либо что-то подобное и вынести летучую мышь на улицу.

Основная мера защиты от летучих мышей: использование механических средств защиты окон (москитные сетки).



ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ УКУСЕ?



После контакта с животным (получение в результате контакта с животным повреждений (царапин, ссадин, укусов) или ослюнения кожных покровов или слизистых) необходимо как можно быстрее (желательно в первые сутки) обратиться в организацию здравоохранения по месту жительства или ближайшую организацию здравоохранения к врачу (травматологу, хирургу) для осмотра, местной обработки ран, царапин, ссадин, мест ослюнения и решения вопроса о назначении курса антирабической помощи (курса прививок).

Лечебно-профилактическую вакцинацию против бешенства проводят по жизненным показаниям и бесплатно (в том числе беременных женщин и детей любого возраста, а также иностранным гражданам).

